

## 医療従事者に聞いた接種後の体調の変化について

年齢・性別	ワクチン接種歴	2回目接種後の体調	2回目と3回目接種の体調の違い	3回目接種後の体調	3回目接種後の感想
20代・女性	1回目：ファイザー 2回目：ファイザー 3回目：ファイザー	接種の翌日の朝、38度の発熱、頭痛、全身倦怠感接種部位の痛みがあった。	2回目より軽い。	2回目ほどの発熱は無く、37度程度であった。翌日から倦怠感、頭痛があったが、解熱鎮痛剤を服用し落ち着いた。接種部位の痛みは数日続いた。	副反応は個人差が大きいように感じた。感染拡大、重症化予防のためにも接種できる方は3回目も接種すべきだと思う。
30代・女性	1回目：ファイザー 2回目：ファイザー 3回目：ファイザー	接種翌日昼頃から発熱と頭痛があり、その日の夕方ピークで38.5°Cの発熱があった。市販の解熱鎮痛剤を服用したところ、接種の翌々日の夕方には平熱に戻り、頭痛も治まった。	2回目より軽い。	接種翌日の昼頃、37.5°Cの発熱と頭痛があったが、その日の夕方には平熱に戻った。	3回目接種後の方が副反応が軽かった。
20代 女性	1回目：ファイザー 2回目：ファイザー 3回目：ファイザー	38度を超える発熱。倦怠感。インフルエンザ罹患時のような関節痛。	2回目と比較すると副反応は少なかった。 3回目は2回目と比較して頭痛が強かった。	接種した翌日の昼前から37.5度程度の発熱、頭痛。 市販の解熱鎮痛剤を飲んだらすぐに回復した。	思ったより副反応が強くなく安心した。
40代・女性	1回目：ファイザー 2回目：ファイザー 3回目：ファイザー	接種翌日の夕方から38.7°Cの発熱、倦怠感 翌日には解熱	3回目のほうが軽い。	接種部位の疼痛のみで、著変なし	接種部位の痛みのみで、翌日、翌々日も発熱症状なしでした。
30代・女性	1回目：ファイザー 2回目：ファイザー 3回目：武田/モデルナ	接種部位の痛みが2日間程度あった。翌日、発熱は微熱程度だったが、倦怠感があった。次の日には、症状は何もなかった。	2回目より重い。	接種翌日、38度程度の発熱・倦怠感があった。市販の薬を飲み、次の朝には平熱に戻った。接種部位の痛みは2日間程度あった。	追加接種でモデルナを接種すると効果が高いとの情報を聞き、接種することにした。 接種量も初回接種の半量なこともあり、副反応も接種翌日だけであり、次の日は症状は何もなかった。 新型コロナウイルスが流行している状況で、ワクチンの種類に関わらず早期に接種することをお勧めします。
40代・男性	1回目：ファイザー 2回目：ファイザー 3回目：武田/モデルナ	接種して数時間後から徐々に接種部位の痛み。痛みは2日間程度あった。発熱、倦怠感等の副反応は無かった。	2回目と同程度。	接種して数時間後から徐々に接種部位の痛み。痛みは2回目接種後と同程度であり、2日間程度あった。発熱、倦怠感等の副反応は無かった。	3回目接種をモデルナにしたことで、副反応に違いがあるかもしれないと思っていたが、2回目接種後と同程度であった。
50代・女性	1回目：ファイザー 2回目：ファイザー 3回目：武田/モデルナ	接種部位の痛み、発熱があった。発熱のピークは、接種翌日の昼前で、38.5°Cであった。解熱鎮痛剤を服用し回復した。	2回目より軽い。	2回目接種時には、痛みにより腕を上げることが困難であったが、3回目接種後に痛みはほとんどなく、発熱も発生しなかった。薬を服用する必要がなく、通常通り出勤することができた。	2回目接種までは、副反応がひどかったため、3回目接種を行うか悩んでいた。もし万が一、感染してしまった際に重症化し、家事や仕事などに影響することを考えると接種してよかったと思う。