

# こうすりや~ええい農

Agricultural news

のう  
農

vol. 16

このコーナーでは、  
農業のちょっとしたコツを、  
市の営農指導員と  
地域おこし協力隊員から  
お知らせします。

## 営農指導員の ワンポイントアドバイス

営農指導員  
永奥 啓

今からでも直売所用に  
コスモスの播種ができます

### 1 経営上の特性

切り花用のコスモスは年間隨時播種（種まき）が可能で、しかも70～80日前後という短期間で切り花にできる取り組みやすい花きです。

近年では切り花用に多くの品種が登売されており、以前からのピンクはもとより、白や黄色、赤、白に赤の覆輪（※1）・絞り（※2）など豊富です。

一方、単価が安価であるという面もあるので、他の花きと組み合わせた補完的な品目として考えるのが良いでしょう。

※1 覆輪：外縁部分が異なる色で縁取られていること  
※2 絞り：縦方向に異なる色が入っていること



**2 作型（露地栽培秋出荷）**  
播種（種まき）：7月下旬  
開花：10月下旬～11月上旬  
この作型は旧庄原市程度の標高

地で栽培する一例ですが、7月よりも早く播種したり、ハウスを利用するなどで、初夏から晚秋まで幅広く栽培が可能です。標高が300メートル以上の地域ではこの作型は霜害に注意が必要です。

### 3 播種

播種は狙いとする出荷期から逆算して、70～80日前くらいに行います。この花きは畑にじかまきする場合が多いのですが、この場合種子が小さいので、覆土は種子が隠れる程度の少なめにします。

### 4 施肥

肥料を多くやり過ぎると、軟弱・徒長となるので、瘦せ地以外では無肥料とします。

### 5 生育中の管理

倒伏防止のためにフレーネットを張り、生育に合わせて引き上げていきます。

病害虫の発生は比較的少ない花きですが、うどんこ病（※3）に注意しましょう。

※3 うどんこ病：うどん粉をまぶしたように、葉の表面に白いカビが生える病気



動物も食べごろを見極めるのに、収穫直前に被害に遭ったスズメバチやアシナガバチなどには、所々に石を置いていたり、穴を開けられてしまっています。また、目が細

ネットを使用して守るときは、必ず下側も補強してください。タヌキやアナグマなどには、所々に石を置いていたり、穴を開けられてしまっています。また、目が細かい丈夫なネットでないと、穴を開けられたりもします。「電気柵」やメッシュできちんと守ればいいのは分かつているのだけれど、電気柵本体は高額。自分たちが食べるために、補助金をもらってまするのは…。

## 地域で「生き生き」と 獣害対策その一歩先へ！

地域おこし協力隊  
草谷 夏枝

●夏野菜真っ盛り！だけど…  
収穫を楽しみましょう

近年は「トウモロコシは鳥獸被害に遭うので作るのはやめた」という人が多いと聞きます。トウモロコシはタヌキやアナグマ、アライグマなど中型の動物のほか、カラスにも対策が必要です。

近年は「トウモロコシは鳥獸被害に遭うので作るのはやめた」という人が多いと聞きます。トウモロコシはタヌキやアナグマ、アライグマなど中型の動物のほか、カラスにも対策が必要です。

### ●地域での取り組み紹介

ひがし野菜市の会

獣害対策の先進地視察で見たサロンのにぎわいをヒントに、獣害対策をして守った野菜で、地域のふれあいの場としての野菜市を開催しています。

### 【美湯ハイツ「竹きりたい」】

動物の潜み場所にもなる竹やぶ伐採など、ハイツ周りの環境整備に自主的に取り組んでいます。



伐採した竹は竹パウダーバーに、竹やぶが冬の日差しを遮り、道路凍結の原因になっていたとか。きっかけはどうあれ、環境整備は獣害対策にもなります。

### 問い合わせ

商工林業課林業振興係  
0824-73-1132

農業振興課農業振興係  
0824-73-1132